

IPSSとQOLスコア

前立腺肥大症の重症度を評価するために世界共通で使用されている質問票です。IPSSにて7つの質問による症状の頻度を点数化し、また、QOLスコアにより患者さんの不満度を点数化することで、重症度の判定に役立てます。

※IPSS = International Prostate Symptom Score (国際前立腺症状スコア) ※QOLスコア=IPSS-QOLスコア

国際前立腺症状スコア (IPSS)	全くない	5回に1回の割合より少ない	2回に1回の割合より少ない	2回に1回の割合	2回に1回の割合より多い	ほとんどいつも
Q. どれくらいの割合で次のような症状がありましたか？						
この1か月の間に、尿をしたあとにまだ尿が残っている感じがありましたか？	0	1	2	3	4	5
この1か月の間に、尿をしてから2時間以内にもう一度しなくてはならないことがありましたか？	0	1	2	3	4	5
この1か月の間に、尿をしている間に尿が何度もとぎれることがありましたか？	0	1	2	3	4	5
この1か月の間に、尿を我慢するのが難しいことがありましたか？	0	1	2	3	4	5
この1か月の間に、尿の勢いが弱いことがありましたか？	0	1	2	3	4	5
この1か月の間に、尿をし始めるためにお腹に力を入れることがありましたか？	0	1	2	3	4	5
この1か月の間に、夜寝てから朝起きるまでにふつう何回尿をするために起きましたか？	0回 0	1回 1	2回 2	3回 3	4回 4	5回以上 5

あなたの合計スコアは何点？

点

IPSS重症度

0-7点
軽症

8-19点
中等症

20-35点
重症

QOLスコア	とても満足	満足	ほぼ満足	いなんとも えな	やや不満	とてもいや
現在の尿の状態がこのまま変わらずに続くとしたら、どう思いますか？	0	1	2	3	4	5

あなたのスコアは何点？

点

QOL重症度

0,1点
軽症

2,3,4点
中等症

5,6点
重症

この結果は、医師が、重症度や治療法の選択、治療効果の評価などに使用するものであり、患者さん自身での自己診断を推奨するものではありません。



前立腺肥大症について相談できる

医療機関を掲載しています

<https://www.bph-chiryu.jp/hospital.html>

Boston Scientific
Advancing science for life™

ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社
本社 東京都中野区中野4-10-2 中野セントラルパークサウス
www.bostonscientific.jp